



Meilensteine zur Entstehung der Positurkanarienvrassen und Auftreten der Mutationen bei Farbenkanarienvrassen

Uwe Feiter
Thomas Müller


Kleine glatte Rassen




Fife
entstanden
um 1950 in
der schottischen
Grafschaft Fife




Border
entstanden
um 1830
in der Grenz-
region Südschottland
und Nordengland





**Raza
Espanola**
entstanden
ab 1931 in
Spanien



Gloster
entstanden um
1920 in der
englischen
Grafschaft
Gloucestershire



**Deutsche
Haube**
entstanden
um 1750 in
Deutschland



Lizard
um 1750 in
Frankreich
entstanden, in
England zum
Lizard kultiviert



Große glatte Rassen




Lancashire

entstanden zwischen 1780 und 1820 in der englischen Grafschaft Lancashire (GB)




Norwich

entstanden ab Ende des 16. Jahrhunderts in Norwich (GB)



Llarguet Espanol

entstanden vor 1950 in den span. Provinzen Casteló und Valencia (E)



Yorkshire

entstanden um 1850 in der englischen Grafschaft Yorkshire (GB)



Crest

entstanden zwischen 1870 und 1890 in England



Berner


entstanden um 1880 in der Gegend um Bern (CH)




Figurenkanarien glatte Rassen



Scotch
entstanden
Anfang des 19.
Jahrhundert
in Glasgow



Bossu Belge
entstanden
ab etwa 1800 in
Belgien




Rheinländer
entstanden
ab 1980 in
Hilden im
Rheinland (D)




Münchener
entstanden
um 1900 in
München (D)



Japan Hoso
entstanden in
Japan um 1925



Stammbaum der frisierten Rassen




Genealogischer Stammbaum der frisierten Kanariensassen
nach Georgio de Baseggio (1972)
aus „Der Vogelfreund“ 1/98



Gerade frisierte Rassen




Mehringer
entstanden ab 1983
in Mehring (D)




Pariser Trompeter
entstanden
um 1850 in
Paris (F)



Nordholländer
entstanden
um 1900 in
Nordfrankreich



Paduaner
entstanden in
Padua (I) ca.
1955




Fiorino
entstanden in
Florenz (I), seit
1982 international
bekannt



Arricciato Gigante Italiano


entstanden in
Italien, nach

Ablehnung einer Standardänderung
für Pariser Trompeter 1991





Figurenkanarien frisierte Rassen



Südholländer
entstanden
um 1920 in
Südfrankreich



**Giboso
Español**
entstanden
um 1980 in
Spanien




**Melado
Tinerfeno**
entstanden
um 1850 auf
Teneriffa (E)



**Schweizer
Frisé**
entstanden
um 1900 in
der Schweiz



**Gibber
Italicus**
entstanden
ca. 1950 in
Süditalien



Makige
entstanden in
Japan um 1920





Mutationen bei Farbenkanarien

-  **dominat weiß**
entstanden 1667 in Deutschland, nach dem Aussterben 1914 erneut bei Bibrack in Ostpreußen wieder entdeckt
-  **braun**
entstanden um 1700 in Deutschland
-  **achat (verdünnt)**
entstanden um 1725 – dann leider verschwunden; 1910 in Holland wieder entdeckt, dann über die Braunreihe isabell erzüchtet
-  **rezessiv weiß**
 entstanden 1908 gleichzeitig in England und Neuseeland
-  **rot**
entstanden 1915 durch Genintroduktion aus Mischlingen Kapuzenzeisig x Kanarie bei den deutschen Züchtern Balsler (Fulda) und Dahms (Königsberg)
-  **Mosaik**
entstanden durch Genintroduktion aus Mischlingen Kapuzenzeisig x Kanarie, seit 1976 auch Typ 2
-  **opal**
entstanden 1949 in Deutschland (Fürth) beim Züchter Rosner



-  **Ivor (Lipochrom-Pastell)**
entstanden 1950 in Holland beim Züchter P.J. Helder
-  **Melanin-Pastell**
entstanden 1957 in Holland beim Züchter H. Kollen, durch weitere Selektion ab 1968 zum Grauflügel weiterentwickelt
-  **phaeo**
entstanden 1964 in Belgien beim Züchter Jean Piere Ceuppens
-  **satinet**
entstanden 1966 in Holland
-  **optischer Blaufaktor**
um 1970 in Italien entstanden
-  **topas**
entstanden 1976 in Italien beim Züchter Asheri
-  **eumo**
entstanden 1981 in Holland beim Züchter van Haaff
-  **onyx**
entstanden 1986 in Spanien beim Züchter Liorens
-  **kobalt**
entdeckt 1994 in Deutschland (Ulm)